

Solvenix®

Mot venösa ödem och tyngdkänsla

Ny receptfri behandling för symtomlindring av kronisk venös insufficiens

En tredjedel av vuxna svenskar har varicer, det vanligaste tecknet på kronisk venös insufficiens.^{1,2} Kronisk venös insufficiens är ett betydande hälsoproblem i hela världen, där grundbehandlingen är kompressionsbehandling.^{2,3}

Under hösten 2022 lanseras Solvenix® - ett växtbaserat läkemedel för lindring av symtom vid venös insufficiens i benen som åderbräck, svullnad, tyngdkänsla, smärta och klåda. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare. Solvenix innehåller extrakt av frö från hästkastanj (*Aesculus hippocastanum* L.) och tas dagligen för optimal effekt. För vuxna över 18 år.




- ✓ Reducerar ödem
- ✓ Minskar tyngdkänsla
- ✓ Lindrar smärta

Patientnytta:

- Receptfritt växtbaserat läkemedel som behandlar symtom på kronisk venös insufficiens såsom svullna ben, tyngdkänsla, smärta, klåda, spänningsskänsla och vadkramp¹
- Likvärdig klinisk effekt som kompressionsstrumpor på ödem efter 12 veckor⁵
- Använd Solvenix som ett alternativ till kompressionsbehandling eller som komplementbehandling
- Inga interaktioner har rapporterats

Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Patient bör enbart sluta med kompressionsbehandling i samråd med läkare. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare.⁴



Figur. Förändringar i underbensvolym hos 240 patienter med kronisk venös insufficiens utvärderades i en randomiserad, delvis blindad studie med antingen placebo, extrakt av hästkastanjfrö (HCSE 50mg, två gånger dagligen) eller kompressionsstrumpor under 12 veckor. Resultat presenteras som skillnader (medelvärde ±SEM) i underbensvolym jämfört med baslinje. Båda behandlingsgrupperna visade signifikant minskning av underbensvolym efter behandling jämfört med placebo. $P < 0,01$ Grafen är modifierad från Diehm et al. av Sana Pharma Medical AS.

Referenser:

1. 1177, Vårdguiden (22/05/5) (<https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/blodkarl/aderbrack-i-benen/>). 2. Internetmedicin (22/05/5) (<https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/kirurgi/venos-insufficiens/>). 3. World Union of Wound Healing Societies (WUWHs). Principles of best practice: compression in venous leg ulcers. A consensus document. London, UK: MEP Ltd; 2008. 4. FASS (22/05/5) (<https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&npIld=20090224000355>). 5. Diehm C, Trampisch HJ, Lange S, Schmidt C. Comparison of leg compression stocking and oral horse-chestnut seed extract therapy in patients with chronic venous insufficiency. Lancet. 1996 Feb 3;347(8997):292-4.

Solvenix hårda depotkapslar, *Aesculus hippocastanum* L. Kärlskyddande medel. ATC-nr. C05. OTC, VBL, EF. 1 depotkapsel innehåller 240 – 290 mg torrt extrakt av frö från hästkastanj, motsvarande 50 mg triterpenglykosider beräknat som aescin. **Indikation:** Växtbaserat läkemedel för lindring av symtom orsakade av störningar i det venösa blodflödet i benen, så kallad kronisk venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbräck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda, spänningsskänsla och vadkramp. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare. **Doserings:** Vuxna: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen. Kapslarna sväljes hela tillsammans med vätska. Om magbesvär uppkommer rekommenderas att kapslarna tas tillsammans med måltid. Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år. **Behandlingstid:** Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot innehållsämne. **Varningar och försiktighet:** Om symtomen försämras efter behandlingsstart, eller om effekt inte har uppnåtts efter 6 veckor, bör andra orsaker till benödem utredas. Vid hudinflammationer, tromboflebit, hudförhårdnader, svår smärta, sår, plötslig bensvullnad eller hjärt- eller njursvikt, bör sjukvården kontaktas. Tidigare ordinerad kompressionsbehandling (stödstrumpa) bör ej avslutas utan samråd med läkare. **Graviditet och amning:** I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet eller amning. **Biverkningar:** Lindriga mag- och tarmbesvär, illamående, huvudvärk, yrsel, klåda och allergiska reaktioner har rapporterats. Frekvensen är okänd. **Förpackning:** 60 kaps. **Ytterligare information:** Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se och www.fass.se. Baserat sig på produktresumé: 2021-07-19.