

Solvenix®

- behandlar dålig blodcirkulation i benen



Likvärdig
effekt som
stödstrumpor
efter 12 veckor

- ✓ Reducerar svullnad (ödem) i fötter och ben
- ✓ Lindrar smärta och tyngdkänsla
- ✓ Kliniskt bevisad effekt

Solvenix®

- behandlar dålig blodcirkulation i benen



Visste du att det finns ett receptfritt läkemedel med likvärdig effekt som stödstrumpor?

MÅLGRUPP

För vuxna över 18 år med dålig blodcirkulation i benen (venös insufficiens) som ofta åtföljs av åderbråck.

KUNDNYTTA

- Receptfritt läkemedel som lindrar symtom vid venös insufficiens i benen som åderbråck, svullnad, smärta, tyngdkänsla, klåda, spänningsskänsla och vadkramper.
- Likvärdig effekt som stödstrumpor efter 12 veckor, klinisk dokumenterad effekt.
- Kan användas med eller utan stödstrumpor.
- Alternativ till stödstrumpor tillsvidare, eller under perioder som vår/sommar.

DOSERING

- 1 depotkapsel 2 gånger dagligen, märkbar effekt efter 4 veckor, optimal effekt efter 12 veckor.
- Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare.

ATT HA I ÅTANKE

- Har läkare ordinerat kompressionsstrumpor bör man enbart sluta i samråd med läkare.
- Uteslut att svullnaden i benen orsakas av annan sjukdom än dålig blodcirkulation.
- Ej för gravida eller ammande.

Intresserad av att läsa mer om Solvenix?
Skanna QR-koden



Solvenix hårda depotkapslar, *Aesculus hippocastanum* L. Kärlskyddande medel. ATC-nr. C05. OTC, VBL, EF. 1 depotkapsel innehåller 240 – 290 mg torrt extrakt av frö från hästkastanj, motsvarande 50 mg triterpenglykosider beräknat som aescin. Indikation: **Växtbaserat läkemedel för lindring av symtom orsakade av störningar i det venösa blodflödet i benen**, så kallad kronisk venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda, spänningsskänsla och vadkramper. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare. Dosering: Vuxna: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen. Kapslarna sväljes hela tillsammans med vätska. Om magbesvär uppkommer rekommenderas att kapslarna tas tillsammans med måltid. Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år. Behandlingstid: Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. Kontraindikationer: Överkänslighet mot innehållsämne. Varningar och försiktighet: Om symtomen försämras efter behandlingsstart, eller om effekt inte har uppnåtts efter 6 veckor, bör andra orsaker till benödem utredas. Vid hudinflammationer, tromboflebit, hudförhårdnader, svår smärta, sår, plötslig bensvullnad eller hjärt- eller njursvikt, bör sjukvården kontaktas. Tidigare ordinerad kompressionsbehandling (stödstrumpa) bör ej avslutas utan samråd med läkare. Graviditet och amning: I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet eller amning. Biverkningar: Lindriga mag- och tarmbesvär, illamående, huvudvärk, yrsel, klåda och allergiska reaktioner har rapporterats. Frekvensen är okänd. Förpackning: 60 kaps. Ytterligare information: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se och www.fass.se. Baserar sig på produktresumé: 2021-07-19. SO2507ZB